

स्ट्रोक से बचाव के लिए दवा लेना

एट्रियल फिब्रिलेशन वाले लोगों के लिए एक प्लान (योजना)

नाम: _____ फ़ोन नंबर: _____ आपातकालीन संपर्क: _____

जनरल प्रैक्टीशनर (GP): _____ अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता: _____

मैं इस प्लान का इस्तेमाल कैसे करूँ?



एट्रियल फिब्रिलेशन, स्ट्रोक और एंटीकोएगुलेंट दवा के बारे में जानने के लिए इस प्लान का इस्तेमाल करें। आप यह भी कर सकते/ती हैं:

- अपने डॉक्टर (GP) के साथ पेज 1 पर अपनी एंटीकोएगुलेंट दवा के बारे में जानकारी लिखें।
- अपने डॉक्टर (GP) के साथ पेज 2 पर अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों के बारे में जानकारी लिखें।
- यह जानकारी अपने दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडरों (स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं) के साथ शेयर करें।

हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके डॉक्टर (GP), ब्लड कलेक्टर, डेंटिस्ट, डाइटीशियन, नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, पोडियाट्रिस्ट और स्पेशलिस्ट जैसे लोग होते हैं। आप उन्हें यह प्लान दिखा सकते/ती हैं, ताकि उन्हें पता चले कि आप एंटीकोएगुलेंट दवा ले रहे/रही हैं।

एट्रियल फिब्रिलेशन और स्ट्रोक क्या हैं?



- एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपका दिल अनियमित रूप से धड़कता है।
- एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण आपके हृदय में रक्त के थक्के बन सकते हैं।
- यदि रक्त का थक्का आपके मस्तिष्क तक पहुँच जाता है, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है।
- स्ट्रोक मस्तिष्क को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे आपके चलने, बोलने, निगलने या सोचने के तरीके पर असर पड़ सकता है।
- एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी स्थिति है जो ठीक नहीं होती है।

एंटीकोएगुलेंट कैसे काम करते हैं?

- एंटीकोएगुलेंट्स खून पतला करने वाली दवा है।
- यह रक्त का थक्का बनना अधिक कठिन बना देते हैं।
- एंटीकोएगुलेंट लेने से स्ट्रोक के आपके खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- आप जो एंटीकोएगुलेंट लेते/ती हैं उसका प्रकार और डोज़ (खुराक) अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपको इसे पूरी ज़िंदगी लेना होगा।

यह वीडियो देखें और एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में अधिक जानें
नीचे दिए गए QR कोड या लिंक का उपयोग करें



<https://shorturl.at/1G30a>

आपकी एंटीकोएगुलेंट्स दवा के बारे में जानकारी (डॉक्टर (GP) को भरना है)

दवा का नाम	कितनी मात्रा लें (डोज़)	कब लें



जब तक आपका डॉक्टर (GP) न कहे, अपना एंटीकोएगुलेंट लेना बंद न करें

अपने डॉक्टर (GP) से इन बातों पर चर्चा करें:

- एंटीकोएगुलेंट्स से ब्लीडिंग का खतरा
- ब्लीडिंग या चोट लगने से बचने या उसका प्रबंध करने के लिए आप क्या कर सकते/ती हैं
- अगर आप अपने एंटीकोएगुलेंट की डोज़ लेना भूल जाएं तो क्या करें
- मेडिकल अलर्ट कार्ड या ब्रेसलेट पहनना (ताकि लोग देख सकें कि आप एंटीकोएगुलेंट्स लेते हैं)
- चिकित्सा अपॉइंटमेंट कब लेना है



क्या अपनी दवाओं के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं?

Medicines Line 1300 633 424 पर कॉल करें



ट्रांसलेटिंग और इंटरप्रिटिंग सर्विसेज़ (अनुवाद एवं दुभाषिया सेवाएँ) (TIS)

131 450 पर कॉल करें

एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ जीना

एट्रियल फिब्रिलेशन के लक्षण जानें



चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना



सांस फूलना



घबराहट या धड़कन का तेज़ होना



अत्यधिक थकान



सीने में दर्द

अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो एंटीकोएगुलंट्स सिर्फ स्ट्रोक से बचाव के लिए हैं।

इनमें से कुछ लक्षणों में मदद के लिए आपको दूसरी दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है।

एट्रियल फिब्रिलेशन वाले हर किसी व्यक्ति में यह लक्षण नहीं होंगे।

अगर आपको कोई नए लक्षण दिखें या आपके लक्षण और बिगड़ जाएं, तो 24 घंटे के अंदर अपने डॉक्टर (GP) से संपर्क करें।

अपनी दवाओं का सुरक्षित उपयोग करें



- अपनी दवाएं वैसे ही लें जैसे आपके डॉक्टर (GP) ने बताई हैं। हर दिन, तब भी जब आप ठीक महसूस करें।
- अगर आपको अपनी दवाइयों का प्रबंध करने में मदद चाहिए, तो अपने फार्मासिस्ट से बात करें।
- कोई भी नई दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर (GP) या फार्मासिस्ट से सलाह लें। इसमें डॉक्टर की लिखी दवाएँ, ओवर-द-काउंटर दवाएँ, विटामिन और सप्लीमेंट शामिल हैं।

अपने हृदय की मदद करने के तरीके	मेरे लक्ष्य	मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा/गी
<input type="checkbox"/> सेहतपूर्ण वज़न का लक्ष्य रखें		
<input type="checkbox"/> रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) नियंत्रित करें		
<input type="checkbox"/> धूम्रपान छोड़ें		
<input type="checkbox"/> शराब कम पिएं		
<input type="checkbox"/> अपने शरीर को गतिशील रखें		
<input type="checkbox"/> अन्य कार्य		

संपर्क करें यदि आप चिंतित या बेचैन महसूस कर रहे/रही हैं, तो इनसे संपर्क करें:



- परिवार या दोस्त
- एट्रियल फिब्रिलेशन वाले दूसरे लोग जो समझेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं
- एक विश्वसनीय स्वास्थ्य पेशेवर



एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में



स्ट्रोक की रोकथाम के बारे में



कल्याण के बारे में

यदि इनमें से कुछ भी हो तो सीधे अस्पताल जाएं या 000 पर कॉल करें और एम्बुलेंस के लिए कहें:



स्ट्रोक के लक्षण

- **F:** face drooped (चेहरा झुका हुआ है)
- **A:** arms can't be raised (हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं)
- **S:** speech slurred or confused (बोली अस्पष्ट या भ्रमित है)
- **T:** time is critical call 000 (समय नाजुक है, 000 पर कॉल करें)



गंभीर रक्तस्राव के लक्षण

- नाक से खून आना जो रुकता ही न हो
- खांसी या खून की उल्टी
- पेशाब या मल त्याग में खून आना
- खून बहना या चोट लगना जो और भी बदतर हो जाए
- अचानक और तेज़ सिरदर्द

Quality Use of Medicines Alliance (दवाओं के गुणवत्तापूर्ण उपयोग गठबंधन)



द्वारा समर्थित:

